

HAGA LA PREGUNTA SOBRE LOS OPIOIDES

“¿Cómo puedo
reducir la necesidad
de usar opioides?”

EXISTE UNA RESPUESTA

EXPAREL[®]
(bupivacaine liposome injectable suspension)

OPIOID FREE

PREGUNTAR ES FÁCIL

“¿Existen
alternativas a
los opioides?”

Hacerle a su médico la pregunta sobre los opioides es el paso más sencillo que puede dar para lograr el control del dolor, reduciendo, a la vez, el consumo de opioides. La verdad es que *existe* una manera de manejar el dolor posquirúrgico con menos opioides o directamente sin ellos.



EXPAREL ES UNA OPCIÓN LIBRE DE OPIOIDE QUE OFRECE ALIVIO DURADERO DEL DOLOR

EXPAREL comienza a controlar el dolor durante la cirugía para que pueda comenzar su recuperación

- Solo 1 dosis, administrada por su médico, de modo que tiene una cosa menos de qué ocuparse
- Proporciona control del dolor durante los primeros días después de la cirugía, cuando lo necesite más, adormeciendo la zona del cuerpo donde se realizó la cirugía
- Actúa directamente en el lugar de la cirugía, a diferencia de los opioides, que afectan todo el cuerpo
- Los estudios clínicos demostraron que los pacientes que recibieron EXPAREL tuvieron menos necesidad de opioides*

*El beneficio clínico de la disminución en el consumo de opioides no se demostró en los estudios clínicos esenciales.

Indicación

EXPAREL está indicado para la infiltración de dosis única en adultos, a fin de producir analgesia local posterior a la cirugía y como bloqueo nervioso interescalénico del plexo braquial para producir una analgesia regional posterior a la cirugía. La seguridad y la eficacia no se han establecido en otros bloqueos nerviosos.

Información Importante de Seguridad

EXPAREL no debe usarse en anestesia obstétrica de bloqueo paracervical.

En los estudios donde se inyectó EXPAREL en la herida, los efectos secundarios más frecuentes fueron náuseas, estreñimiento y vómitos.

**Consulte la Información de Prescripción completa que se adjunta.
Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient
o llame al 1-855-RX-EXPAREL (793-9727).**

EXPAREL[®]
(bupivacaine liposome injectable suspension)

OPIOID FREE

HAGA UN PLAN DE MANEJO DEL DOLOR ANTES DE LA CIRUGÍA

Usted puede opinar sobre cómo se trata el dolor que sienta después de la cirugía

Somos únicos y cada uno siente el dolor de manera diferente. Pida a su médico que lo ayude a armar un plan de manejo del dolor que le sirva a usted. El plan se basará en el tipo de cirugía que se le realice, la zona del cuerpo donde se llevará a cabo el procedimiento, cuánto dolor puede manejar, su tolerancia a los medicamentos para el dolor, su salud general y de qué manera el dolor puede afectar su recuperación.

- Las mujeres sienten el dolor de forma diferente que los hombres. ¿Qué podría significar esto para usted?
- Los efectos secundarios de algunos medicamentos para el dolor podrían retrasar su recuperación más de lo que usted espera
- ¿Le preocupa que su familia tenga acceso a opioides? La exposición a las drogas a menudo comienza en el hogar
- ¿Es un paciente oncológico? Evitar los opioides puede beneficiar su recuperación

Información Importante de Seguridad (continuación)

En los estudios donde se inyectó EXPAREL cerca de un nervio, los efectos secundarios más frecuentes fueron náuseas, fiebre y estreñimiento.

EXPAREL no está recomendado para usar en pacientes menores de 18 años de edad o en mujeres embarazadas.

Informe a su proveedor de atención médica si tiene enfermedad hepática, ya que esto puede afectar la forma en que el ingrediente activo (bupivacaína) de EXPAREL se elimina del cuerpo.

Consulte la Información de Prescripción completa que se adjunta.

Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient o llame al 1-855-RX-EXPAREL (793-9727).

EXPAREL puede proporcionar alivio después de todo tipo de cirugías, lo que incluye

- Cirugía general (p. ej., de colon, estómago, hernia, riñón, pérdida de peso)
- Cirugía ortopédica (p. ej., de rodilla, cadera, columna vertebral, pie, tobillo, hombro, mano, lesiones deportivas)
- Cirugía oral (p. ej., muela del juicio, mandíbula)
- Cirugías obstétricas/ginecológicas (p. ej., histerectomía, fibromas, mama, parto por cesárea)

¿No encuentra su cirugía aquí? EXPAREL puede ser una opción de todos modos. Hable con su médico para obtener más información.

HAGA LA PREGUNTA SOBRE LOS OPIOIDES


“¿Existen
opciones no opioides
para mi cirugía?”

EXPAREL[®]
(bupivacaine liposome injectable suspension)

OPIOID FREE

¿LE PREOCUPA USAR OPIOIDES?

PREGUNTE SOBRE EXPAREL



OPIOIDES Y NARCÓTICOS: 2 NOMBRES PARA LOS MISMOS ANALGÉSICOS DE VENTA CON RECETA, CON LOS MISMOS RIESGOS

Muchas personas reciben opioides después de la cirugía, pero estos no siempre son la mejor opción

Los efectos secundarios de los opioides pueden retrasar su recuperación

- Los opioides pueden causar náuseas, vómitos y estreñimiento
- Los opioides pueden hacer que se sienta somnoliento o confundido

Los opioides pueden tener efectos a largo plazo, incluidos el consumo inadecuado y el consumo a largo plazo

- Más de 50 millones de personas han informado que han consumido fármacos de venta con receta por motivos no médicos al menos una vez
- 1 de cada 15 pacientes que recibieron un opioide después de la cirugía se volvió consumidor a largo plazo
 - Algunos desarrollan tolerancia y necesitan dosis más altas con el tiempo

Información Importante de Seguridad (continuación)

EXPAREL no debe inyectarse dentro de la columna vertebral, las articulaciones o las venas.

El ingrediente activo de EXPAREL:

- Puede afectar su sistema nervioso y su sistema cardiovascular
- Puede causar una reacción alérgica
- Puede hacer daño si se inyecta en las articulaciones
- Puede provocar un trastorno raro de la sangre

**Consulte la Información de Prescripción completa que se adjunta.
Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient
o llame al 1-855-RX-EXPAREL (793-9727).**

EXPAREL®
(bupivacaine liposome injectable suspension)

OPIOID FREE

HAGA LA PREGUNTA SOBRE LOS OPIOIDES

EXISTE UNA RESPUESTA

Indicación

EXPAREL está indicado para la infiltración de dosis única en adultos, a fin de producir analgesia local posterior a la cirugía y como bloqueo nervioso interescalénico del plexo braquial para producir una analgesia regional posterior a la cirugía. La seguridad y la eficacia no se han establecido en otros bloqueos nerviosos.

Información Importante de Seguridad

EXPAREL no debe usarse en anestesia obstétrica de bloqueo paracervical. En los estudios donde se inyectó EXPAREL en la herida, los efectos secundarios más frecuentes fueron náuseas, estreñimiento y vómitos. En los estudios donde se inyectó EXPAREL cerca de un nervio, los efectos secundarios más frecuentes fueron náuseas, fiebre y estreñimiento. EXPAREL no está recomendado para usar en pacientes menores de 18 años de edad o en mujeres embarazadas. Informe a su proveedor de atención médica si tiene enfermedad hepática, ya que esto puede afectar la forma en que el ingrediente activo (bupivacaína) de EXPAREL se elimina del cuerpo. EXPAREL no debe inyectarse dentro de la columna vertebral, las articulaciones o las venas.

El ingrediente activo de EXPAREL:

- Puede afectar su sistema nervioso y su sistema cardiovascular
- Puede causar una reacción alérgica
- Puede hacer daño si se inyecta en las articulaciones
- Puede provocar un trastorno raro de la sangre

Consulte la Información de Prescripción completa que se adjunta.

Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient o llame al 1-855-RX-EXPAREL (793-9727).

VISITE WWW.EXPAREL.COM/PATIENT PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.



©2019 Pacira BioSciences, Inc.
Parsippany, NJ 07054 PP-EX-US-4918 04/19

EXPAREL[®]
(bupivacaine liposome injectable suspension)

OPIOID FREE